

Kardiologická ambulance **Cardiall** vás indikuje ke koronarografii. Jedná se o katetrizační vyšetření srdečních tepen, které lékaři umožní přesně zobrazit případná zúžení nebo uzávěry, jež mohou způsobovat bolest na hrudi či dušnost. Výkon probíhá na specializovaném pracovišti invazivní kardiologie.

PRŮBĚH VÝKONU

- **Místní znecitlivění:** Výkon probíhá při vědomí. Lékař znecitliví místo vpichu, nejčastěji na zápěstí nebo méně často v tříse.
- **Zavedení katetru:** Tenkou ohebnou trubičkou (katetrem) se lékař dostane k ústí srdečních tepen. Tento proces nebolí, uvnitř cév nemáme nervy citlivé na bolest.
- **Kontrastní látka:** Do tepen se vstříkne malé množství látky, která se zobrazí na rentgenu. Můžete pocítit krátkodobé teplo po těle.
- **Možná léčba (PCI):** Pokud lékař objeví zúžení, může jej v mnoha případech ihned ošetřit pomocí balonku a zavedením výztuže (stentu).

PŘÍPRAVA A HOSPITALIZACE

Pobyt v nemocnici

Standardně hospitalizace trvá 1 až 2 dny. Pokud je výkon proveden přes zápěstí a bez komplikací, bývá odchod domů možný velmi brzy.

Důležité instrukce

K výkonu se dostavte nalačno. O případném vysazení léků na ředění krve nebo léků na cukrovku vás budeme informovat v ordinaci.

PO VÝKONU

Péče o místo vpichu

Po výkonu přes zápěstí budete mít na ruce tlakový náramek. Ruku je třeba nechat v klidu, nezvedat těžká břemena a nepodpírat se o ni po dobu několika dní.

Režim v případě třísla

Při vstupu přes třísla je nutný klid na lůžku (cca 6–8 hodin) s nataženou nohou, aby se předešlo krvácení.

Pitný režim

Po výkonu je důležité hodně pít vodu, aby se z těla přes ledviny rychleji vyplavila kontrastní látka.

Následná péče

S výslednou zprávou z nemocnice se dostavíte k nám do ambulance **Cardiall**, kde naplánujeme další postup léčby.